

FE DE ERRATAS

Por un error involuntario, el artículo denominado “**Estudios bioarqueológicos de un entierro del Holoceno Medio en el interior de un abrigo rocoso: el caso de Cerro Bayo 2 (Santa Cruz Argentina)**”, doi: <https://doi.org/10.24215/18536387e115> (publicado en línea: 05/12/2025), presenta un error en la Tabla 2. El valor modificado corresponde al número y porcentaje de la distribución irregular de marcas de raíces en elementos indeterminados. La información correcta de la Tabla 2 es la siguiente:

TABLA 2. Resultados de las variables tafonómicas relevadas según parte anatómica.

Parte anatómica	NISP	Pérdida ósea	Meteorización	Blanqueamiento	Fracturas postdeposicionales	Alteración térmica	Marcas de corte	Óxido manganeso
		n(%)	n(%)	n(%)	n(%)	n(%)	n(%)	Presencia n(%)
Cráneo	51	50(98%)	9(17,6%)	1(2%)	41(80,4%)	0(0%)	1(2%)	45(88,2%)
Mandíbula	3	3(100%)	0(0%)	0(0%)	2(66,7%)	0(0%)	0(0%)	2(66,7%)
Cintura escapular	0	0(0%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)
Columna vertebral	5	5(100%)	0(0%)	0(0%)	1(20%)	0(0%)	0(0%)	4(80%)
Tórax	20	20(100%)	0(0%)	0(0%)	20(100%)	0(0%)	0(0%)	20(100%)
Miembro superior	2	2(100%)	0(0%)	0(0%)	2(100%)	0(0%)	0(0%)	2(100%)
Cintura pélvica	1	1(100%)	0(0%)	0(0%)	1(100%)	0(0%)	0(0%)	1(100%)
Miembro inferior	19	19(100%)	0(0%)	0(0%)	15(78,9%)	5(26,3%)	0(0%)	18(94,7%)
Indeterminado	86	86(100%)	0(0%)	0(0%)	50(58,1%)	9(10,5%)	0(0%)	70(81,4%)
Total	187	186(99,5%)	9(4,8%)	1(0,5%)	132(70,6%)	14(7,5%)	1(0,5%)	162(86,6%)

Parte Anatómica	Marcas de Raíces								
	Presencia	Distribución			Frecuencia			Profundidad	
		Uniforme n(%)	Irregular n(%)	Escasa n(%)	Moderada n(%)	Extensa n(%)	Leve n(%)	Moderada n(%)	Abundante n(%)
Cráneo	49(96,1%)	3(6,1%)	46(93,9%)	39(79,6%)	9(18,4%)	1(2%)	39(79,6%)	9(18,4%)	1(2%)
Mandíbula	3(100%)	0(0%)	3(100%)	1(33,3%)	2(66,7%)	0(0%)	1(33,3%)	2(66,7%)	0(0%)
Cintura escapular	0(0%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)
Columna vertebral	5(100%)	0(0%)	5(100%)	4(80%)	1(20%)	0(0%)	4(80%)	0(0%)	1(20%)
Tórax	20(100%)	14(70%)	6(30%)	1(5%)	19(95%)	0(0%)	6(30%)	14(70%)	0(0%)
Miembro superior	2(100%)	0(0%)	2(100%)	1(50%)	1(50%)	0(0%)	0(0%)	2(100%)	0(0%)
Cintura pélvica	1(100%)	1(100%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	1(100%)	0(0%)	1(100%)	0(0%)
Miembro inferior	19(100%)	2(10,5%)	17(89,5%)	12(63,2%)	7(36,8%)	0(0%)	12(63,2%)	6(31,6%)	1(5,3%)
Indeterminado	71(82,6%)	61(85,9%)	10(14,1%)	66(93%)	5(7%)	0(0%)	71(100%)	0(0%)	0(0%)
Total	170(90,9%)	81(47,6%)	89(52,4%)	124(66,3%)	44(25,9%)	2(1,2%)	133(78,2%)	34(20%)	3(1,8%)

NISP=número de especímenes identificados.

TABLA 2 (cont.). Resultados de las variables tafonómicas relevadas según parte anatómica.

Parte Anatómica	Carbonato de Calcio (CaCO ₃)						Marcas de Carnívoros
	Presencia	Modo de precipitación			Distribución		Presencia
		Fina	Gruesa	Pequeñas concreciones	Uniforme	Aislado	
	n(%)	n(%)	n(%)	n(%)	n(%)	n(%)	n(%)
Cráneo	8(15,7%)	3(37,5%)	4(50%)	1(12,5%)	5(62,5%)	3(37,5%)	0(0%)
Mandíbula	1(33,3%)	0(0%)	1(100%)	0(0%)	1(100%)	0(0%)	0(0%)
Cintura escapular	0(0%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)
Columna vertebral	4(80%)	0(0%)	4(100%)	0(0%)	4(100%)	0(0%)	0(0%)
Tórax	6(30%)	6(100%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	6(100%)	0(0%)
Miembro superior	2(100%)	2(100%)	0(0%)	0(0%)	1(50%)	1(50%)	0(0%)
Cintura pélvica	0(0%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	1(100%)
Miembro inferior	13(68,4%)	4(30,8%)	6(46,2%)	3(23,1%)	4(30,8%)	9(69,2%)	0(0%)
Indeterminado	50(58,1%)	50(100%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	50(100%)	0(0%)
Total	84(44,9%)	65(77,4%)	15(17,9%)	4(4,8%)	15(17,9%)	69(82,1%)	1(0,5%)

NISP=número de especímenes identificados.

Por otro lado, en el pasaje del texto donde se referencia la Figura 6 (segundo párrafo de la página 18), el orden en el que se mencionan las figuras 6B y 6C está invertido. La forma correcta es la siguiente: "...Se diagnosticó la artropatía a partir del registro de osteofitos marginales de severidad leve y osteofitos en la superficie articular de grado alto de severidad (Fig. 6B). Por su parte, se registró la existencia de cuatro rasgos no-métricos vinculados a actividad. En el fémur derecho se reconoció la presencia de una impresión de la tibia, una Faceta de Charles y una Faceta de Martin. En el fémur izquierdo se identificó una Faceta de Charles (Fig. 6C). Así, puede verse que todas las modificaciones fueron relevadas en las epífisis distales correspondientes a los fémures derecho e izquierdo del individuo adulto. No se identificaron nódulos de Schmorl, cambios entésicos ni casos de porosidad en las superficies articulares..."